



Impiego di dispositivi ottici di ingrandimento per identificazione/preservazione delle strutture

- Loupe Zeiss x3[®]


-endoscopi operatori Storz[®] & Wolf[®]













sequenza chirurgica: sec. Stammberger
(etmoidectomia antero-posteriore, antrostomia al medio, ev.sfenoido e/o frontotomia)





**Pansinusitis with Polyposis
(Group III B)**

INTEGRAZIONE TERAPIA MEDICA – TERAPIA CHIRURGICA:

Blomqvist & Coll., 2001

22 pazienti con poliposi bilaterale simmetrica

Pretrattamento: prednisolone orale x 10 giorni

budesonide locale bilaterale x 1 mese

FESS monolaterale

Postrattamento con budesonide bilaterale

Follow up 12 mesi

OLFATTO MIGLIORATO CON TM, NESSUN BENEFICIO CHIRURGICO

OSTRUZIONE/SECREZIONE NETTAMENTE MIGLIORATA DALL'INTERVENTO

ANATOMICAMENTE NETTO MIGLIORAMENTO POST OPERATORIO

25% dei pazienti richiesero l'intervento dall'altro lato

Rambaux & Coll., 2001

72 pazienti steroidoresistenti

Chirurgia radicale

Steroidoterapia topica 2 mesi dopo

Dopo 1 anno

59.1% symptom & lesions free

28.8% symptom free ma lesion positive

12.2% symptom & lesion positive